

化学療法レジメン

レジメン名 ダラツムマブ/VMP(2-9クール目)

レジメンの概要 多発性骨髄腫

診療科名 血液

投与量設定

ダラキューロ(ダラツムマブ, ホルヒアルロニダゼ アルフア) 1瓶(day1,22), ヘルケイト(ホルテゾミア) 1.3mg/㎡(day1,8,22,29), メルファラン(アルケラン) 9mg/㎡(day1-4)p.o., フレドニゾン 60mg/㎡(day2-4)p.o., レナテックス(デキサメタゾン) 20mg(day1,22)p.o.

管理コード 200042

インターバル日数

42 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間) カロナール(アセトアミノフェン) 500mg(day1,22)p.o., ホララミン(d-クロルフェニラミンマレイン酸塩) 2mg(day1,22)p.o.

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 8	Day 22	Day 29					
1	皮下注射	時間: _____	★デキサメタゾン, カロナール, ホララミン内服 (ダラキューロ投与1時間前まで)★ 臍から左又は右に約7.5cmの腹部皮下に 本剤15mLを約3~5分かけて投与	●	ダラキューロ注	1瓶	○		○						
2	皮下注射	時間: _____	1Vにつき生食1.2mLで 溶解(残破棄) 生食の欄:total量を記載	●	ヘルケイト注 生食液NS 20mL	1.3mg/㎡ 1管	○	○	○	○					