

化学療法レジメン

レジメン名 アテゾリズマブ/nab-PTX/CBDCA

上限:4クール

レジメンの概要 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)

診療科名 呼吸器

投与量設定 テセントリク(アテゾリズマブ) 1200mg/body(day1),アブラキサン(パクリタキセル:アルミン懸濁型) 100mg/m²(day1,8,15),カルボプラチン AUC=4~6,投与量=AUC×(25+GFR)(day1)

管理コード 250204

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 8	Day 15							
1	点滴静注 末梢メイン	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○	○							
2	点滴静注 末梢メイン	時間: 30分	フィルターライン使用 ※初回は60分	●	テセントリク注 大塚生食注(250mL袋)	1200mg/body 1袋	○									
3	点滴静注 末梢メイン	時間: 10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フソー」50mL	1瓶	○									
4	点滴静注 末梢メイン	時間: 30分			デキサート注射液6.6mg アロカス点滴静注235mg パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1瓶 1瓶 1袋	○									
5	点滴静注 末梢側管	時間: 30分	調製濃度5mg/mL アブラキサン溶解液のみ 点滴(生食残破棄) 生食の欄:total量を記載 フィルター不可	●	アブラキサン注 大塚生食注(100mL瓶)	100mg/m ² 1瓶	○	○	○							
6	点滴静注 末梢メイン	時間: 10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フソー」50mL	1瓶	○									
7	点滴静注 末梢メイン	時間: 1時間		●	カルボプラチン注 大塚糖液5%(250mLソフトバッグ)	AUC=4~6 1袋	○									

4クール施行後
アテゾリズマブ(250095)へ移行