

化学療法レジメン

レジメン名 nab-PTX/CBDCA

レジメンの概要 非小細胞肺癌、肺小細胞癌【適応外】

診療科名 呼吸器 投与量設定 アブラキサン(パクリタキセル:アルブミン懸濁型) 100mg/m²(day1,8,15),カルボプラチン AUC=4~6,投与量=AUC × (25 + GFR)(day1)

管理コード 250017 インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 8	Day 15						
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○	○						
2	点滴静注	時間: 30分			デキサート注射液6.6mg	1瓶	○								
					アロカス点滴静注235mg	1瓶									
					パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1袋									
3	点滴静注	時間: 30分	調製濃度5mg/mL アブラキサン溶解液のみ 点滴(生食残破棄) 生食の欄:total量を記載 フィルター不可	●	アブラキサン注	100mg/m ²	○	○	○						
					大塚生食注(100mL瓶)	1瓶									
4	点滴静注	時間: 10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フソー」50mL	1瓶	○								
5	点滴静注	時間: 1時間		●	カルボプラチン注	AUC=4~6	○								
					大塚糖液5%(250mLソフトバッグ)	1袋									