

化学療法レジメン

レジメン名 GEM/CBDCA(泌尿器)

レジメンの概要 膀胱癌・腎盂尿管癌

診療科名 泌尿器

投与量設定 ゲムシタビン 1000mg/m²(day1,8),カルボプラチン AUC=3~4,投与量=AUC × (25 + GFR)(day1),アプレビタント 125mg(day1) 80mg(day2,3) p.o

管理コード 300010

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

| Rp | 手技・投与経路 | 点滴時間 | 用法・その他 | 癌 | 薬品名称 | 用量/単位 | Day 1 | Day 8 | | | | | | | |
|----|---------------|---------|--|---|--|-----------------------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 点滴静注 末梢メイン | 時間: 3時間 | | | リユージェンF注 500mL | 1瓶 | ○ 10:00 | ○ 10:00 | | | | | | | |
| 2 | 点滴静注 末梢側管 | 時間: 30分 | ★アプレビタント内服(3日間連投 1日目:カルボプラチン投与1~1.5時間前 2日目以降:午前中)★ | | デキサート注射液6.6mg グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50mL | 1瓶 1袋 | ○ 10:00 | | | | | | | | |
| 3 | 点滴静注 末梢側管 | 時間: 30分 | | | デキサート注射液6.6mg 大塚生食注(100mL瓶) | 0.5瓶 1瓶 | | ○ 10:00 | | | | | | | |
| 4 | 点滴静注 末梢側管 | 時間: 30分 | | ● | ゲムシタビン注 大塚生食注(100mL瓶) | 1000mg/m ² 1瓶 | ○ 11:00 | ○ 11:00 | | | | | | | |
| 5 | 点滴静注 末梢側管 | 時間: 1時間 | | ● | カルボプラチン注 大塚糖液5%(250mLソフトバッグ) | AUC=3~4 1袋 | ○ 11:30 | | | | | | | | |
| 6 | 点滴静注 末梢メイン | 時間: 3時間 | | | ソルデム3A輸液(500mL) | 1袋 | ○ 13:00 | | | | | | | | |
| 7 | 点滴静注 末梢メイン | 時間: 3時間 | | | リユージェンF注 500mL | 1瓶 | ○ 16:00 | | | | | | | | |