

化学療法レジメン

レジメン名 GEM/CDDP(泌尿器:GC)

レジメンの概要 進行期膀胱癌・腎盂癌・尿管癌 3次治療

診療科名 泌尿器

投与量設定 ゲムシタビン 1000mg/m²(day1,8),シスプラチン 70mg/m²(day1),アプレピタント 125mg(day1) 80mg(day2,3) p.o

管理コード 300005

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 8			
1	点滴静注 末梢メイン	時間: 2時間			ソリューゲンF注 500mL	1瓶	○ 9:15	○ 6:00 (6時間)	○ 6:00 (8時間)	○ 6:00 (8時間)	○ 6:00 (8時間)	○ 9:15			
2	点滴静注 末梢側管	時間: 15分	★アプレピタント内服(3日間連続 1日目:シスプラチン投与1~1.5時間前 2日目以降:午前中)★		フロセド注射液20mg 生理食塩液PL「フソー」50mL	0.5管 1瓶	○ 11:00	○ 11:00	○ 11:00						
3	点滴静注 末梢メイン	時間: 15分			デキサート注射液6.6mg パロネトロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1.5瓶 1袋	○ 11:15								
4	点滴静注 末梢側管	時間: 15分			デキサート注射液6.6mg 大塚生食注(100mL瓶)	1瓶 1瓶		○ 11:15	○ 11:15	○ 11:15					
5	点滴静注 末梢メイン	時間: 15分			デキサート注射液6.6mg 大塚生食注(100mL瓶)	0.5瓶 1瓶						○ 11:15			
6	点滴静注 末梢メイン	時間: 30分		●	ゲムシタビン注[GEM] 大塚生食注(100mL瓶)	1000mg/m ² 1瓶	○ 11:30					○ 11:30			
7	点滴静注 末梢メイン	時間: 3時間			ソルデム3A輸液(500mL)	1袋						○ 12:00			
8	点滴静注 末梢メイン	時間: 2時間	不要分を抜いて 合計600mLに調製	●	シスプラチン注 大塚生食注(500mL袋)	70mg/m ² 1袋	○ 12:00	積算値チェック							
9	点滴静注 末梢メイン	時間: 5時間			ソルデム3A輸液(500mL)	1袋	○ 14:00	○ 12:00 (6時間)	○ 14:00 (8時間)	○ 14:00 (8時間)	○ 14:00 (8時間)				
10	点滴静注 末梢メイン	時間: 5時間			ソリューゲンF注 500mL	1瓶	○ 19:00	○ 18:00 (6時間)	○ 22:00 (8時間)	○ 22:00 (8時間)					
11	点滴静注 末梢側管	時間: 15分			フロセド注射液20mg 生理食塩液PL「フソー」50mL	0.5管 1瓶	○ 20:00	○ 20:00							
12	点滴静注 末梢メイン	時間: 6時間			ソルデム3A輸液(500mL)	1袋	○ 0:00	○ 0:00							