

化学療法レジメン

レジメン名【呼】PEM+CBDCA

上限：6クール

レジメンの概要 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌、悪性胸膜中皮腫

診療科名呼吸器

投与量設定 $\wedge^{\circ}$ メトレクト[®] 500mg/m²(day1),カルボプラチン AUC=4~6,投与量=AUC×(25 + GFR) (day1)

管理コード250000

インターバル日数21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1								
1	点滴静注	時間： _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○								
2	点滴静注	時間： 30分			デキサト注射液6.6mg	1瓶	○								
					アカリ点静注235m g	1瓶									
					パロセト点静注バッグ0.75mg 50mL	1袋									
3	点滴静注	時間： 10分	全量100mLに調製	●	$\wedge^{\circ}$ メトレクト [®] 注	500mg/m ²	○								
					大塚生食注(100mL瓶)	1瓶									
4	点滴静注	時間： 1時間		●	カルボプラチン注	AUC=4~6	○								
					大塚糖液5%(250mLソフトパック)	1袋									