

化学療法レジメン

レジメン名 DEX/GEM/CBDCA(GDC)

上限:6クール

レジメンの概要 再発・難治性悪性リンパ腫

診療科名 血液 投与量設定 ゲムシタビン 1000mg/m²(day1,8),カルボプラチン AUC=3~5,投与量=AUC × (25 + GFR)(day1),デカトロン(デキサメタゾン) 40mg/body(day1-4)p.o

管理コード 200050 インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 8							
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○							
2	点滴静注	時間: 30分			パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL アロカス点滴静注235mg	1袋 1瓶	○								
3	点滴静注	時間: 30分			グラネセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL	1袋		○							
4	点滴静注	時間: 30分		●	ゲムシタビン注 大塚生食注(100mL瓶)	1000mg/m ² 1瓶	○	○							
5	点滴静注	時間: 1時間		●	カルボプラチン注 大塚糖液5%(250mLソフトバッグ)	AUC=3~5 1袋	○								