

化学療法レジメン

レジメン名 【呼】ベバシズマブ+PEM

レジメンの概要 扁平上皮癌を除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌

診療科名 呼吸器

投与量設定 $\text{A}^\circ\text{B}^\circ\text{シズマブ}$ 15mg/kg(day1), $\text{A}^\circ\text{M}^\circ\text{レキト}$ 500mg/m²(day1)

管理コード 250009

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1								
1	点滴静注	時間： _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○								
2	点滴静注	時間： 30分	全量100mLに調製 ※初回は1時間30分 2回目は1時間で投与	●	$\text{A}^\circ\text{B}^\circ\text{シズマブ}$ BS注	15mg/ k g	○								
					生理食塩液（希釈用）	1瓶									
3	点滴静注	時間： 10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶	○								
4	点滴静注	時間： 15分			デキサート注射液6.6mg	1瓶	○								
					生理食塩液PL「フー」 50mL	1袋									
5	点滴静注	時間： 10分	全量100mLに調製	●	$\text{A}^\circ\text{M}^\circ\text{レキト}$ 注	500mg/m ²	○								
					大塚生食注(100mL瓶)	1瓶									