

化学療法レジメン

レジメン名 ペムブロリズマブ/PEM/CBDCA

上限: 4クール

レジメンの概要 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)

診療科名 呼吸器

投与量設定 キイトルーダ(ペムブロリズマブ) 200mg/body(day1), ペムトレキセド 500mg/m²(day1), カルボプラチン AUC=3~5, 投与量=AUC × (25 + GFR)(day1)

管理コード 250200

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1										
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○										
2	点滴静注	時間: 30分	フィルターライン使用	●	キイトルーダ注 生理食塩液PL「フソー」50mL	200mg/body 1瓶	○	4クール施行後 ペムブロリズマブ/PEM(250201)へ移行									
3	点滴静注	時間: 10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フソー」50mL	1瓶	○										
4	点滴静注	時間: 30分			デキサート注射液6.6mg アロカス点滴静注235mg パロネトロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	0.5瓶 1瓶 1袋	○										
5	点滴静注	時間: 10分	全量100mLに調製	●	ペムトレキセド注 大塚生食注(100mL瓶)	500mg/m ² 1瓶	○										
6	点滴静注	時間: 1時間		●	カルボプラチン注 大塚糖液5%(250mLソフトバッグ)	AUC=3~5 1袋	○										