

化学療法レジメン

レジメン名 ベバシズマブ/PEM/CBDCA

上限:6クール

レジメンの概要 扁平上皮癌を除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌

診療科名 呼吸器

投与量設定 ベバシズマブ 15mg/kg(day1),ペムトレキセド 500mg/m²(day1),カルボプラチン AUC=4~6,投与量=AUC × (25 + GFR)(day1)

管理コード 250008

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1									
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○									
2	点滴静注	時間: 30分	※初回は1時間30分 2回目は1時間で投与	●	ベバシズマブBS注 大塚生食注(100mL瓶)	15mg/kg 1瓶	○	4~6クール施行後 ベバシズマブ/PEM(250009)へ移行								
3	点滴静注	時間: 10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フソー」50mL	1瓶	○									
4	点滴静注	時間: 30分			デキサート注射液6.6mg アロカス点滴静注235mg パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1瓶 1瓶 1袋	○									
5	点滴静注	時間: 10分	全量100mLに調製	●	ペムトレキセド注 大塚生食注(100mL瓶)	500mg/m ² 1瓶	○									
6	点滴静注	時間: 1時間		●	カルボプラチン注 大塚糖液5%(250mLソフトバッグ)	AUC=4~6 1袋	○									