

# 化学療法レジメン

レジメン名 ベンダムスチン/リツキシマブ

上限: 6クール

レジメンの概要 低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫、マントル細胞リンパ腫

診療科名 血液

投与量設定 トリアキシン(ベンダムスチン) 90mg/m<sup>2</sup>(day1,2),リツキサン(リツキシマブ) 375mg/m<sup>2</sup>(day1),カロナール(アセトアミノフェン) 500mg(day1)p.o.,ホララミン(d-クロルフェニラミン酸塩) 2mg/day(day1)p.o.

管理コード 200020

インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2							
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用 ★カロナール,ホララミン内服 (リツキサン投与30分前までに)★		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○							
2	点滴静注	時間: 15分			ソル・コーテフ注射用100mg パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1瓶 1袋	○								
3	点滴静注	時間: 10分		●	トリアキシン注 生理食塩液PL「フソー」50mL	90mg/m <sup>2</sup> 1瓶	○	○							
4	点滴静注	時間: _____	初回:50mL/h開始, 30分毎に50mL/hずつ増量可 2クール目以降:100mL/h開始, 30分毎に100mL/hずつ増量可 ※最大400mL/hまで 10倍に希釈調製して使用	●	リツキサン注 生理食塩液(希釈用)	375mg/m <sup>2</sup> mL	○								