

化学療法レジメン

レジメン名 R-CHOP

上限: 8クール

レジメンの概要 悪性リンパ腫

診療科名 血液

投与量設定 リツキサン(リツキシマブ) 375mg/m²(day1), オンコピン(ビンクリスチン) 1.4mg/m²(day1), ドキソルビシン 50mg/m²(day1), エドキシサン(シクロホスファミド) 750mg/m²(day1), プレドニソ 60mg/m²(day2-6)p.o

管理コード 200005

インターバル日数 14 (Day1から休業期間を含めたレジメン有効期間) カロナール(アセトアミノフェン) 500mg(day1) p.o, ボラミン(ドクソルフェニラミンマレイン酸塩) 2mg/day(day1)p.o

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2							
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用 ★カロナール, ボラミン内服 (リツキサン投与30分前までに)★		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○							
2	側管静注	時間: _____			ソル・コーテフ注射用100mg	1瓶	○								
3	点滴静注	時間: <u>15分</u>			パロノセトロン点滴静注ハッグ0.75mg 50mL	1袋		○							
4	点滴静注	時間: _____	初回:50mL/h開始, 30分毎に50mL/hずつ増量可 2クール目以降:100mL/h開始, 30分毎に100mL/hずつ増量可 ※最大400mL/hまで 10倍に希釈調製して使用	●	リツキサン注 生理食塩液(希釈用)	375mg/m ² mL	○								
5	点滴静注	時間: <u>30分</u>	※最大1回2mg/body	●	オンコピン注 生理食塩液PL「フソー」50mL	1.4mg/m ² 1瓶		○							
6	点滴静注	時間: <u>30分</u>		●	ドキソルビシン注 大塚生食注(100mL瓶)	50mg/m ² 1瓶		○							
				積算値チェック											
7	点滴静注	時間: <u>2時間</u>		●	エドキシサン注 大塚生食注(250mL袋)	750mg/m ² 1袋		○							