

# 化学療法レジメン

レジメン名 R-CHOP

上限：8クール

レジメンの概要 悪性リンパ腫

診療科名 血液

投与量設定

リツキマブ 375mg/m<sup>2</sup>(day1),オシロニン(ヒンクリスチン) 1.4mg/m<sup>2</sup>(day1),ドキシリジン 50mg/m<sup>2</sup>(day1),インドキサリン(シカドファミド) 750mg/m<sup>2</sup>(day1),プレドニソロン 60mg/m<sup>2</sup>(day2-6)p.o

管理コード 200005

インターバル日数

14 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間) カナール(アセトアミノフェン) 500mg(day1) p.o,ホウライミン(d-グルルフェニラミンレイン酸塩) 2mg/day(day1)p.o

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day2								
1	点滴静注	時間：_____	ルートkeep用 フラッシュ用 ★カナール,ホウライミン内服 (リツキマブ投与30分前までに)★		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○								
2	側管静注	時間：_____			リル・コチン注射用100mg	1瓶	○									
3	点滴静注	時間：15分			パロピト点点滴注パック0.75mg 50mL	1袋		○								
4	点滴静注	時間：_____	初回:50mL/h開始, 30分毎に50mL/hずつ増量可 2クール目以降:100mL/h開始, 30分毎に100mL/hずつ増量可 ※最大400mL/hまで 10倍に希釈調製して使用	●	リツキマブ BS注 生理食塩液 (希釈用)	375mg/m <sup>2</sup> mL	○									
5	点滴静注	時間：30分	※最大1回2mg/body	●	オシロニン注 生理食塩液PL「ア」 50mL	1.4mg/m <sup>2</sup> 1瓶		○								
6	点滴静注	時間：30分	<b>積算値チェック</b>	●	ドキシリジン注 大塚生食注(100mL瓶)	50mg/m <sup>2</sup> 1瓶		○								
7	点滴静注	時間：2時間		●	インドキサリン注 大塚生食注(250mL袋)	750mg/m <sup>2</sup> 1袋		○								