

化学療法レジメン

レジメン名【呼】GEM+CBDCA

レジメンの概要進行非小細胞肺癌 初回治療 4-6コース(CDDP認容不要)

診療科名呼吸器投与量設定ゲムシタビン 1000mg/m²(day1,8),カルボプラチン AUC=3~5,投与量=AUC×(25+GFR) (day1)

管理コード250010インターバル日数21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 8							
1	点滴静注	時間： _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○							
2	点滴静注	時間： 30分			デキサト注射液6.6mg	1瓶	○								
					アカリ点静注235m g	1瓶									
					パロチロン点静注パック0.75mg 50mL	1袋									
3	点滴静注	時間： 15分			デキサト注射液6.6mg	0.5瓶		○							
					生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶									
4	点滴静注	時間： 30分		●	ゲムシタビン注	1000mg/m ²	○	○							
					大塚生食注(100mL瓶)	1瓶									
5	点滴静注	時間： 1時間		●	カルボプラチン注	AUC=3~5	○								
					大塚糖液5%(250mLソフトパック)	1袋									