

化学療法レジメン

レジメン名 【呼】PEM+CDDP

上限：6クール

レジメンの概要 切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌、悪性胸膜中皮腫

診療科名 呼吸器 投与量設定 $\text{A}^\circ\text{M}\text{レ}\text{セ}\text{ト}^\circ$ 500mg/ m^2 (day1), $\text{シ}\text{ス}^\circ\text{ラ}\text{フ}\text{ン}$ 75mg/ m^2 (day1)

管理コード 250001 インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1									
1	点滴静注 末梢メイン	時間：_____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○									
2	点滴静注 末梢メイン	時間：2時間			硫酸マグネシウム補正液(20mL)	0.5管	○									
					リルテ [®] Δ3A輸液(500mL)	1袋	10:00									
3	点滴静注 末梢メイン	時間：1時間30分			リルテ [®] Δ1輸液(500mL)	1袋	○									
							12:00									
4	点滴静注 末梢側管	時間：30分	Rp.3開始後、側管から		デキサート注射液6.6mg	1.5瓶	○									
					アロカス点滴静注235mg	1瓶	12:00									
					パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1袋										
5	点滴静注 末梢メイン	時間：10分	全量100mLに調製	●	$\text{A}^\circ\text{M}\text{レ}\text{セ}\text{ト}^\circ$ 注	500mg/ m^2	○									
					大塚生食注(100mL)	1瓶	13:30									
6	点滴静注 末梢メイン	時間：30分			マンニトールS注射液300mL	1袋	○									
							13:40									
7	点滴静注 末梢メイン	時間：2時間	不要分を抜いて 合計600mLに調製	●	$\text{シ}\text{ス}^\circ\text{ラ}\text{フ}\text{ン}$ 注	75mg/ m^2	○									
					大塚生食注(希釈用)	1袋	14:10									
8	点滴静注 末梢メイン	時間：2時間			リルテ [®] Δ3A輸液(500mL)	1袋	○									
							16:10									
9	点滴静注 末梢メイン	時間：2時間			リルテ [®] Δ1輸液(500mL)	1袋	○									
							18:10									

積算値チェック