

化学療法レジメン

レジメン名 【呼】ベバシズマブ+PTX+CBDCA

上限：6クール

レジメンの概要 扁平上皮癌を除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌

診療科名 呼吸器 投与量設定 ベバシズマブ 15mg/kg(day1), パクリタセル 200mg/m²(day1), カルボプラチン AUC=4~6, 投与量=AUC×(25+GFR) (day1)

管理コード 250006 インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1										
1	点滴静注	時間：_____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○										
2	点滴静注	時間：30分	全量100mLに調製 ※初回は1時間30分 2回目は1時間で投与	●	ベバシズマブ BS注	5mg/ kg	○										
					生理食塩液（希釈用）	1瓶											
3	点滴静注	時間：10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶	○										
4	点滴静注	時間：30分			デキサト注射液6.6mg	1.5瓶	○										
					ファモチジン注射用20mg	1管											
					ホウラミン注5mg	2管											
					アロカリス点滴静注235mg	1瓶											
					パロセトロン 点滴静注 パック 0.75mg 50mL	1袋											
5	点滴静注	時間：3時間	フィルターライン使用	●	パクリタセル 注	200mg/m ²	○										
					大塚生食注(500mL袋)	1袋											
6	点滴静注	時間：1時間		●	カルボプラチン 注	AUC=4~6	○										
					大塚糖液5%(250mLソフト パック)	1袋											

4-6クール施行後
【呼】ベバシズマブ(250007)へ移行