

化学療法レジメン

レジメン名 BEP

上限:4クール

レジメンの概要 進行期精巣癌 3クール施行

診療科名 泌尿器 投与量設定 ブレオ(ブレオマイシン) 30mg/body(day1),シスプラチン 20mg/m²(day1-5),エトポシド[®] 100mg/m²(day1-5),アプレビタント 125mg(day1) 80mg(day2,3) p.o

管理コード 300020 インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 8	Day 15
1	点滴静注 末梢メイン	時間: 5時間			ソルデム3A輸液(500mL)	1袋		○ 6:00	○ 6:00	○ 6:00	○ 6:00		
2	点滴静注 末梢メイン	時間: 1時間30分			ソリュケンF注 500mL	1瓶	○ 9:00						
3	点滴静注 末梢メイン	時間: 5時間			塩酸クロプロファミド注10mg ソリュケンF注 500mL	1管 1瓶						○ 9:00	○ 9:00
4	点滴静注 末梢側管	時間: 5分	全開で ★アプレビタント内服(3日間連投 1日目:シスプラチン投与1~1.5時間前 2日目以降:午前中)★	●	ブレオ注 生理食塩液PL「フソー」 50mL	30mg/body 1瓶	○ 10:00	積算値チェック				○ 10:00	○ 10:00
5	点滴静注 末梢メイン	時間: 30分			デキサート注射液6.6mg パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1.5瓶 1袋	○ 10:30						
6	点滴静注 末梢側管	時間: 30分			デキサート注射液6.6mg 大塚生食注(100mL瓶)	1瓶 1瓶		○ 10:30	○ 10:30	○ 10:30	○ 10:30		
7	点滴静注 末梢メイン	時間: 2時間		●	シスプラチン注 大塚生食注(500mL袋)	20mg/m ² 1袋	○ 11:00	○ 11:00	○ 11:00	○ 11:00	○ 11:00	積算値チェック	
8	点滴静注 末梢側管	時間: 15分			フロセミド注射液20mg 生理食塩液PL「フソー」 50mL	0.5管 1瓶	○ 11:00	○ 11:00	○ 11:00	○ 11:00	○ 11:00		
9	点滴静注 末梢メイン	時間: 2時間		●	エトポシド注 大塚生食注(500mL袋)	100mg/m ² 1袋	○ 13:00	○ 13:00	○ 13:00	○ 13:00	○ 13:00		
10	点滴静注 末梢メイン	時間: 5時間			ラクテックG輸液(500mL袋)	1袋	○ 15:00	○ 15:00	○ 15:00	○ 15:00	○ 15:00		
11	点滴静注 末梢メイン	時間: 5時間			ソルデム3A輸液(500mL)	1袋	○ 20:00	○ 20:00	○ 20:00	○ 20:00	○ 20:00		
12	点滴静注 末梢側管	時間: 15分			フロセミド注射液20mg 生理食塩液PL「フソー」 50mL	0.5管 1瓶	○ 20:00	○ 20:00	○ 20:00	○ 20:00	○ 20:00		
13	点滴静注 末梢メイン	時間: 5時間			ソリュケンF注 500mL	1瓶	○ 1:00	○ 1:00	○ 1:00	○ 1:00	○ 1:00		