

# 化学療法レジメン

レジメン名 ダラツムマブ/VMP(1クール目)

レジメンの概要 多発性骨髄腫

診療科名 血液

投与量設定

ダラキューロ(ダラツムマブ, ホルヒアルロニダージェ アルファ) 1瓶(day1,8,15,22,29,36), ヘルケイト(ヘルテゾミブ) 1.3mg/m<sup>2</sup>(day1,8,15,22,29,36), メルファラン(アルケラン) 9mg/m<sup>2</sup>(day1-4)p.o., プレドニゾン 60mg/m<sup>2</sup>(day2-4)p.o., レナチンクス(デキサメタゾン) 20mg(day1,8,15,22,29,36)p.o.

管理コード 200041

インターバル日数 42 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

カロナール(アセトアミノフェン) 500mg(day1,8,15,22,29,36)p.o., ホウライミン(ド-クロルフェニラミン酸塩) 2mg(day1,8,15,22,29,36)p.o.

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 8	Day 15	Day 22	Day 29	Day 36				
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用 ★デキサメタゾン, カロナール, ホウライミン内服 (ダラキューロ投与1時間前までに)★		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○									
2	皮下注射	時間: _____	★デキサメタゾン, カロナール, ホウライミン内服 (ダラキューロ投与1時間前までに)★ 臍から左又は右に約7.5cmの腹部皮下に 本剤15mLを約3~5分かけて投与	●	ダラキューロ注	1瓶	○	○	○	○	○	○				
3	皮下注射	時間: _____	1Vにつき生食1.2mLで 溶解(残破棄) 生食の欄:total量を記載	●	ヘルケイト注 生食液NS 20mL	1.3mg/m <sup>2</sup> 1管	○	○	○	○	○	○				