

# 化学療法レジメン

レジメン名 CHASE

上限:6クール

レジメンの概要 悪性リンパ腫

診療科名 血液

投与量設定 デキサート(デキサメタゾン) 33mg/body(day1-3),エンドキサン(シクロホスファミド) 1200mg/m<sup>2</sup>(day1),シタラビン 2000mg/m<sup>2</sup>(day2-3), エトホシド 100mg/m<sup>2</sup>(day1-3)

管理コード 200011

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間) day2起床時-day4就寝時、1日4回(6時,12時,18時,眠前)ステロイド点眼を両眼に行う(キロサド 副作用予防)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day2	Day3						
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○	○						
2	点滴静注	時間: 30分			プロイメント点滴静注用150mg 大塚生食注(100mL瓶)	1瓶 1瓶	○ 9:00								
3	点滴静注	時間: 30分			パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1袋	○ 9:30								
4	点滴静注	時間: 30分			デキサート注射液6.6mg 大塚生食注(100mL瓶)	5瓶 1瓶	○ 10:00	○ 10:00	○ 10:00						
5	点滴静注	時間: 3時間		●	エンドキサン注 大塚生食注(500mL袋)	1200mg/m <sup>2</sup> 1袋	○ 10:30								
6	点滴静注	時間: 3時間	全量500mLに調製	●	シタラビン注高用量 生理食塩液(希釈用)	2000mg/m <sup>2</sup> 1袋		○ 10:30	○ 10:30						
7	点滴静注	時間: 2時間	※用量200mgを超える 場合は50倍希釈する	●	エトホシド注 大塚糖液5%(500mLソフトバッグ)	100mg/m <sup>2</sup> 1袋	○ 13:30	○ 13:30	○ 13:30						