

化学療法レジメン

レジメン名 CHASE

申請医

上限: 6クール

レジメンの概要 悪性リンパ腫

診療科名 血液

投与量設定 デキサート(デキサメタゾン) 33mg/body(day1-3), エントキサン(シクロホスファミド) 1200mg/m²(day1), シタラビン 2000mg/m²(day2-3), エトホシド 100mg/m²(day1-3)

管理コード 200011

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間) day2起床時-day4就寝時、1日4回(6時, 12時, 18時, 眠前)ステロイド点眼を両眼に行う(キロサイド 副作用予防)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day2	Day3						
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○	○						
2	点滴静注	時間: 30分			パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1袋	○								
					アロカス点滴静注235mg	1瓶	9:30								
3	点滴静注	時間: 30分			デキサート注射液6.6mg	5瓶	○	○	○						
					大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	10:00	10:00	10:00						
4	点滴静注	時間: 3時間		●	エントキサン注	1200mg/m ²	○								
					大塚生食注(500mL袋)	1袋	10:30								
5	点滴静注	時間: 3時間	全量500mLに調製	●	シタラビン注高用量	2000mg/m ²		○	○						
					生理食塩液(希釈用)	1袋		10:30	10:30						
6	点滴静注	時間: 2時間	※用量200mgを超える場合は50倍希釈する	●	エトホシド注	100mg/m ²	○	○	○						
					大塚糖液5%(500mLソフトバッグ)	1袋	13:30	13:30	13:30						