

化学療法レジメン

レジメン名 【呼】ベバシズマブ+PEM+CBDCA

上限：6クール

レジメンの概要 扁平上皮癌を除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌

診療科名 呼吸器

投与量設定 ベバシズマブ 15mg/kg(day1), アモテリト 500mg/m²(day1), カルボプラチン AUC=4~6, 投与量=AUC×(25+GFR) (day1)

管理コード 250008

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1										
1	点滴静注	時間： _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○										
2	点滴静注	時間： 30分	全量100mLに調製 ※初回は1時間30分 2回目は1時間で投与	●	ベバシズマブ BS注	15mg/ k g	○										
					生理食塩液（希釈用）	1瓶											
3	点滴静注	時間： 10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フー」 50mL	1瓶	○	4-6クール施行後 【呼】ベバシズマブ+PEM(250009)へ									
4	点滴静注	時間： 30分			デキサート注射液6.6mg	1瓶	○										
					アモテリト点滴静注235m g	1瓶											
					アモテリト点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1袋											
5	点滴静注	時間： 10分	全量100mLに調製	●	アモテリト 注	500mg/m ²	○										
					大塚生食注(100mL瓶)	1瓶											
6	点滴静注	時間： 1時間		●	カルボプラチン 注	AUC=4~6	○										
					大塚糖液5%(250mLソフトバッグ)	1袋											