

化学療法レジメン

レジメン名 CDDP/VP-16(EP)

レジメンの概要 胚細胞腫瘍(精巣腫瘍)

診療科名 泌尿器

投与量設定 シスプラチン 20mg/m²(day1), エトポシド 100mg/m²(day1), アプレビタント 125mg(day1) 80mg(day2,3) p.o

管理コード 300021

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5				
1	点滴静注 末梢メイン	時間: 5時間			ソルデム3A輸液(500mL)	1袋		○ 6:00	○ 6:00	○ 6:00	○ 6:00				
2	点滴静注 末梢メイン	時間: 1時間30分	★アプレビタント内服(3日間連投 1日目:シスプラチン投与1~1.5時間前 2日目以降:午前中)★		ソユージェンF注 500mL	1瓶	○ 9:00								
3	点滴静注 末梢メイン	時間: 30分			デキサート注射液6.6mg パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1.5瓶 1袋	○ 10:30								
4	点滴静注 末梢側管	時間: 30分			デキサート注射液6.6mg 大塚生食注(100mL瓶)	1瓶 1瓶		○ 10:30	○ 10:30	○ 10:30	○ 10:30				
5	点滴静注 末梢メイン	時間: 2時間		●	シスプラチン注 大塚生食注(500mL袋)	20mg/m ² 1袋	○ 11:00	○ 11:00	○ 11:00	○ 11:00	○ 11:00	積算値チェック			
6	点滴静注 末梢側管	時間: 15分			フロセド注射液20mg 生理食塩液PL「フソー」50mL	0.5管 1瓶	○ 11:00	○ 11:00	○ 11:00	○ 11:00	○ 11:00				
7	点滴静注 末梢メイン	時間: 2時間		●	エトポシド注 大塚生食注(500mL袋)	100mg/m ² 1袋	○ 13:00	○ 13:00	○ 13:00	○ 13:00	○ 13:00				
8	点滴静注 末梢メイン	時間: 5時間			ラテックG輸液(500mL袋)	1袋	○ 15:00	○ 15:00	○ 15:00	○ 15:00	○ 15:00				
9	点滴静注 末梢メイン	時間: 5時間			ソルデム3A輸液(500mL)	1袋	○ 20:00	○ 20:00	○ 20:00	○ 20:00	○ 20:00				
10	点滴静注 末梢側管	時間: 15分			フロセド注射液20mg 生理食塩液PL「フソー」50mL	0.5管 1瓶	○ 20:00	○ 20:00	○ 20:00	○ 20:00	○ 20:00				
11	点滴静注 末梢メイン	時間: 5時間			ソユージェンF注 500mL	1瓶	○ 1:00	○ 1:00	○ 1:00	○ 1:00	○ 1:00				