

# 化学療法レジメン

レジメン名 ニボルマブ/CapeOX

レジメンの概要 治癒切除不能な進行・再発の胃癌

診療科名 消化器

投与量設定 オプジーホ(ニボルマブ) 360mg/body(day1),オキサリプラチン 130mg/m<sup>2</sup>(day1),セロダ(カペシタビン) 1000mg/m<sup>2</sup>/回 1日2回(day1-14) p.o

管理コード 100202

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1								
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○								
2	点滴静注	時間: 30分	全量60mLに調製 フィルターライン使用	●	オプジーホ注 生理食塩液(希釈用)	360mg/body 1瓶	○								
3	点滴静注	時間: 15分			デキサート注射液6.6mg グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50mL	1瓶 1袋	○								
4	点滴静注	時間: 2時間	全量500mLに調製	●	オキサリプラチン注 ブドウ糖液5%(希釈用)	130mg/m <sup>2</sup> 1袋	○								