

化学療法レジメン

レジメン名 DA-EPOCH Dose Level 6

上限:8クール

レジメンの概要 悪性リンパ腫

診療科名 血液

投与量設定

エトポシド 124.4mg/m²(day1-4),オンコピン(ピンカシチン) 0.4mg/m²(day1-4),ドキシルビシン 24.8mg/m²(day1-4),エンドキサン(シクロホスファミド) 1866mg/m²(day5),フレドニゾン 60mg/m²/回 1日2回(day1-5)p.o

管理コード 200107

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6			
1	点滴静注 末梢メイン	時間: 24時間	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(1000mLソフトバック)	1袋	○ 9:00	○ 9:00	○ 9:00	○ 9:00	○ 9:00				
2	点滴静注 末梢側管	時間: 30分	側管上部		グラネセロン点滴静注バッグ1mg/50mL	1袋	○ 9:00	○ 9:00	○ 9:00	○ 9:00					
3	点滴静注 末梢側管	時間: 30分	側管上部		プロイメント点滴静注用150mg 大塚生食注(100mL瓶)	1瓶 1瓶	○ 9:30								
4	点滴静注 末梢側管	時間: 30分	側管上部		パロノセロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1袋					○ 9:00				
5	点滴静注 末梢側管	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用 側管下部		生理食塩液PL「フノー」50mL	1瓶	○	○	○	○	○				
6	点滴静注 末梢側管	時間: 24時間	側管下部 <small>※エトポシド用量200mgを超える場合は50倍希釈する</small>	● オンコピン注 ● ドキシルビシン注 ● エトポシド注	0.4mg/m ² 24.8mg/m ² 124.4mg/m ² 大塚生食注(500mLソフトバック)	1袋	○ 10:00	○ 10:00	○ 10:00	○ 10:00			積算値チェック		
7	点滴静注 末梢側管	時間: 3時間	側管下部	● エンドキサン注	1866mg/m ² 大塚生食注(100mL瓶)	1瓶					○ 10:00				
8	点滴静注 末梢側管	時間: 30分	側管上部		グラネセロン点滴静注バッグ1mg/50mL	1袋	○ 21:00	○ 21:00	○ 21:00	○ 21:00					
9	皮下注射	時間: _____	エンドキサン注終了後 24時間以上経過してから投与		ジーラスタ皮下注	1筒						○			