

化学療法レジメン

レジメン名 DA-EPOCH Dose Level 5

上限: 8クール

レジメンの概要 悪性リンパ腫

診療科名 血液

投与量設定

エトポシド 103.7mg/m²(day1-4),オンコピン(ピンカシチン) 0.4mg/m²(day1-4),ドキシルビシン 20.7mg/m²(day1-4),エンドキサン(シクロホスファミド) 1555mg/m²(day5),フレドニゾロン 60mg/m²/回 1日2回(day1-5)p.o

管理コード 200106

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6				
1	点滴静注 末梢メイン	時間: 24時間	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(1000mLソフトバック)	1袋	○ 9:00	○ 9:00	○ 9:00	○ 9:00	○ 9:00					
2	点滴静注 末梢側管	時間: 30分	側管上部		グラネセロン点滴静注バッグ1mg/50mL	1袋	○ 9:00	○ 9:00	○ 9:00	○ 9:00						
3	点滴静注 末梢側管	時間: 30分	側管上部		プロイメント点滴静注用150mg 大塚生食注(100mL瓶)	1瓶 1瓶	○ 9:30									
4	点滴静注 末梢側管	時間: 30分	側管上部		パロノセロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1袋					○ 9:00					
5	点滴静注 末梢側管	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用 側管下部		生理食塩液PL「フノー」50mL	1瓶	○	○	○	○	○					
6	点滴静注 末梢側管	時間: 24時間	側管下部 <small>※エトポシド用量200mgを超える場合は50倍希釈する</small>	● オンコピン注 ● ドキシルビシン注 ● エトポシド注	大塚生食注(500mLソフトバック)	0.4mg/m ² 20.7mg/m ² 103.7mg/m ² 1袋	○ 10:00	○ 10:00	○ 10:00	○ 10:00			積算値チェック			
7	点滴静注 末梢側管	時間: 3時間	側管下部	● エンドキサン注	大塚生食注(100mL瓶)	1555mg/m ² 1瓶					○ 10:00					
8	点滴静注 末梢側管	時間: 30分	側管上部		グラネセロン点滴静注バッグ1mg/50mL	1袋	○ 21:00	○ 21:00	○ 21:00	○ 21:00						
9	皮下注射	時間: _____	エンドキサン注終了後 24時間以上経過してから投与		ジーラスタ皮下注	1筒						○				