

化学療法レジメン

レジメン名 DA-EPOCH Dose Level 3

申請医

上限:8クール

レジメンの概要 悪性リンパ腫

診療科名 血液

投与量設定 エトポシド 72mg/m²(day1-4),オンコピン(ビンクリスチン) 0.4mg/m²(day1-4),ドキシソルピシン 14.4mg/m²(day1-4),エンドキサン(シクロホスファミド) 1080mg/m²(day5),フレドニゾン 60mg/m²/回 1日2回(day1-5),p.o

管理コード 200104

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6			
1	点滴静注 末梢メイン	時間: 24時間	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(1000mLソフトパック)	1袋	○ 9:00	○ 9:00	○ 9:00	○ 9:00	○ 9:00				
2	点滴静注 末梢側管	時間: 30分	側管上部		グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50mL アロカス点滴静注235mg	1袋 1瓶	○ 9:00								
3	点滴静注 末梢側管	時間: 30分	側管上部		グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50mL	1袋		○ 9:00	○ 9:00	○ 9:00					
4	点滴静注 末梢側管	時間: 30分	側管上部		パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1袋					○ 9:00				
5	点滴静注 末梢側管	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用 側管下部		生理食塩液PL「フソー」50mL	1瓶	○	○	○	○	○				
6	点滴静注 末梢側管	時間: 24時間	側管下部 ※エトポシド用量200mgを超える 場合は50倍希釈する	●	オンコピン注 ドキシソルピシン注 エトポシド注 大塚生食注(500mLソフトパック)	0.4mg/m ² 14.4mg/m ² 72mg/m ² 1袋	○ 10:00	○ 10:00	○ 10:00	○ 10:00	積算値チェック				
7	点滴静注 末梢側管	時間: 3時間	側管下部	●	エンドキサン注 大塚生食注(100mL瓶)	1080mg/m ² 1瓶					○ 10:00				
8	点滴静注 末梢側管	時間: 30分	側管上部		グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50mL	1袋	○ 21:00	○ 21:00	○ 21:00	○ 21:00					
9	皮下注射	時間: _____	エンドキサン注終了後 24時間以上経過してから投与		ジーラスタ皮下注	1筒						○			