

化学療法レジメン

レジメン名 トラスツズマブ(初回8mg/kg)/ペルツズマブ(840mg/body)/PTX

レジメンの概要 HER2陽性の乳癌

診療科名 乳腺

投与量設定 トラスツズマブ 8mg/kg(day1),ハーゼータ(ペルツズマブ) 840mg/body(day1),パクリタキセル 80mg/m²(day1,8,15)

管理コード 150068

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 8	Day 15						
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○	○						
2	点滴静注	時間: <u>1時間30分</u>	注射用水の欄:total量を記載 溶解後濃度:21mg/mL 必要量を抜き取り希釈	●	トラスツズマブBS注 注射用水(100mL) 大塚生食注(250mL袋)	8mg/kg 1瓶 1袋	○								
3	点滴静注	時間: <u>1時間</u>		●	ハーゼータ注 大塚生食注(250mL袋)	840mg 1袋	○								
4	点滴静注	時間: <u>15分</u>			デキサート注射液6.6mg ファモチジン注射用20mg ホアラミン注5mg 生理食塩液PL「フソー」50mL	1瓶 1管 2管 1瓶	○	○	○						
5	点滴静注	時間: <u>1時間</u>	フィルターライン使用	●	パクリタキセル注 大塚生食注(250mL袋)	80mg/m ² 1袋	○	○	○						