

化学療法レジメン

レジメン名 ESHAP

上限:4クール

レジメンの概要 再発・難治性悪性リンパ腫

診療科名 血液 投与量設定 ソル・ホドロール(メチルプレドニゾロン) 500mg/body(day1-5),シスプラチン 25mg/m²(day1-4),エトホシド 40mg/m²(day1-4),シタラビン 2000mg/m²(day5)

管理コード 200013 インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間) day5起床時-day6就寝時、1日4回(6時,12時,18時,眠前)ステロイド点眼を両眼に行う(キザイド 副作用予防)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5				
1	点滴静注 末梢メイン	時間: 6時間	ルート①		大塚生食注(500mLソフトパック)	1袋	○ 9:00	○ 9:00	○ 9:00	○ 9:00	○ 9:00				
2	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用 ルート②		生理食塩液PL「フソー」50mL	1瓶	○	○	○	○	○				
3	点滴静注	時間: 30分	ルート②		フロイメント点滴静注用150mg 大塚生食注(100mL瓶)	1瓶 1瓶	○ 9:00								
4	点滴静注	時間: 15分	ルート②		パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1袋	○ 9:30								
5	点滴静注	時間: 15分	ルート②		ソル・ホドロール注500mg 生理食塩液PL「フソー」50mL	1瓶 1瓶	○ 9:45	○ 9:45	○ 9:45	○ 9:45	○ 9:45				
6	点滴静注 末梢側管	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用 ルート①		生理食塩液PL「フソー」50mL	1瓶	○	○	○	○					
7	点滴静注 末梢側管	時間: 24時間	不要分を抜いて 合計600mLに調製 ルート①	●	シスプラチン注 大塚生食注(希釈用)	25mg/m ² 1袋	○ 10:00	○ 10:00	○ 10:00	○ 10:00					
8	点滴静注	時間: 2時間	ルート②		マンニトールS注射液300mL	1袋	○ 10:00	○ 10:00	○ 10:00	○ 10:00					
9	点滴静注	時間: 2時間	全量500mLに調製 ルート②	●	シタラビン注高用量 生理食塩液(希釈用)	2000mg/m ² 1袋					○ 10:00				
10	点滴静注	時間: 1時間	※エトホシド用量200mgを超える 場合は50倍希釈する ルート②	●	エトホシド注 大塚糖液5%(500mLソフトパック)	40mg/m ² 1袋	○ 12:00	○ 12:00	○ 12:00	○ 12:00					
11	点滴静注 末梢メイン	時間: 6時間	ルート①		大塚生食注(500mLソフトパック)	1袋	○ 15:00	○ 15:00	○ 15:00	○ 15:00	○ 15:00				
12	点滴静注 末梢メイン	時間: 6時間	ルート①		硫酸マグネシウム補正液(20mL) 大塚生食注(500mLソフトパック)	1管 1袋	○ 21:00	○ 21:00	○ 21:00	○ 21:00					
13	点滴静注	時間: 2時間	ルート②		マンニトールS注射液300mL	1袋	○ 21:00	○ 21:00	○ 21:00	○ 21:00					
14	点滴静注 末梢メイン	時間: 6時間	ルート①		大塚生食注(500mLソフトパック)	1袋	○ 3:00	○ 3:00	○ 3:00	○ 3:00					

積算値チェック