

化学療法レジメン

レジメン名 ABVD

上限:6クール

レジメンの概要 ホジキンリンパ腫

診療科名 血液

投与量設定 ドキシルピシン 25mg/m²(day1,15),エグザール(ビンブラスチン) 6mg/m²(day1,15),プレオ(プレオマイシン) 10mg/m²(day1,15),ダカルバジン 375mg/m²(day1,15)

管理コード 200026

インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 15							
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○							
2	点滴静注	時間: 30分			ソル・コーテフ注射用100mg	1瓶	○	○							
					パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1袋									
					アロカス点滴静注235mg	1瓶									
3	点滴静注	時間: 10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フソー」50mL	1瓶	○	○							
4	点滴静注	時間: 30分	積算値チェック	●	ドキシルピシン注	25mg/m ²	○	○							
					生理食塩液PL「フソー」50mL	1瓶									
5	点滴静注	時間: 15分	※最大1回10mg/body	●	エグザール注	6mg/m ²	○	○							
					生理食塩液PL「フソー」50mL	1瓶									
6	点滴静注	時間: 30分	※最大1回15mg/body	●	プレオ注	10mg/m ²	○	○							
			積算値チェック		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶									
7	点滴静注	時間: 2時間	点滴経路全般を 遮光して投与	●	ダカルバジン注	375mg/m ²	○	○							
					大塚生食注(250mL袋)	1袋									