

化学療法レジメン

レジメン名 ABVD

上限:6クール

レジメンの概要 ホジキンリンパ腫

診療科名 血液

投与量設定 ドキシソルピシン 25mg/m²(day1,15),エグザール(ビンブラスチン) 6mg/m²(day1,15),プレオ(フレオマイシン) 10mg/m²(day1,15),ダカルバジン 375mg/m²(day1,15)

管理コード 200026

インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 15							
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○							
2	点滴静注	時間: 30分			プロイメント点滴静注用150mg 大塚生食注(100mL瓶)	1瓶 1瓶	○	○							
3	点滴静注	時間: 15分			ソル・コーテフ注射用100mg パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1瓶 1袋	○	○							
4	点滴静注	時間: 30分		●	ドキシソルピシン注 生理食塩液PL「フソー」50mL	25mg/m ² 1瓶	○	○							
				積算値チェック											
5	点滴静注	時間: 15分	※最大1回10mg/body	●	エクザール注 生理食塩液PL「フソー」50mL	6mg/m ² 1瓶	○	○							
6	点滴静注	時間: 30分	※最大1回15mg/body	●	プレオ注 大塚生食注(100mL瓶)	10mg/m ² 1瓶	○	○							
				積算値チェック											
7	点滴静注	時間: 2時間	点滴経路全般を 遮光して投与	●	ダカルバジン注 大塚生食注(250mL袋)	375mg/m ² 1袋	○	○							