

化学療法レジメン

レジメン名 AVD/ブレンツキシマブ ベドチン

上限:6クール

レジメンの概要 未治療のCD30陽性のホジキンリンパ腫

診療科名 血液

投与量設定 ドキシソルピシン 25mg/m²(day1,15),エクサール(ビンブラスチン) 6mg/m²(day1,15),ダカルバシン 375mg/m²(day1,15),アドセトリス(ブレンツキシマブ ベドチン) 1.2mg/kg(day1,15),カロナル(アトセトリス/ファン) 500mg(day1,15)p.o,ホウランシ(ドコロルフェニラミン酸塩) 2mg/day(day1,15)p.o

管理コード 200115

インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 15							
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用 ★カロナル,ホウランシ内服 (アドセトリス投与30分前までに)★		大塚生食注(100mL瓶)	1袋	○	○							
2	点滴静注	時間: 30分			プロイメント点滴静注用150mg 大塚生食注(100mL瓶)	1瓶 1瓶	○	○							
3	点滴静注	時間: 15分			ソル・コーテフ注射用100mg パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1瓶 1袋	○	○							
4	点滴静注	時間: 30分		●	トキシソルピシン注 生理食塩液PL「フソー」50mL	25mg/m ² 1瓶	○	○							
				積算値チェック											
5	点滴静注	時間: 15分	※最大1回10mg/body	●	エクサール注 生理食塩液PL「フソー」50mL	6mg/m ² 1瓶	○	○							
6	点滴静注	時間: 2時間	点滴経路全般を 遮光して投与	●	ダカルバシン注 大塚生食注(250mL袋)	375mg/m ² 1袋	○	○							
7	点滴静注	時間: _____	フラッシュ用		生理食塩液PL「フソー」50mL	1瓶	○	○							
8	点滴静注	時間: 30分	1Vにつき注射用水10.5mLで溶解 注射用水の欄:total量を記載 溶解後濃度:5mg/mL 必要量を抜き取り希釈	●	アドセトリス注 注射用水(100mL) 大塚生食注(100mL瓶)	1.2mg/kg 1瓶 1瓶	○	○							