

# 化学療法レジメン

レジメン名 ブレンツキシマブ ベドチン

上限:16クール

レジメンの概要 再発又は難治性のCD30陽性のホジキンリンパ腫及び末梢性T細胞リンパ腫

診療科名 血液

投与量設定 アトセトリス(ブレンツキシマブ ベドチン) 1.8mg/kg(day1),カロナール(アセトアミノフェン) 500mg(day1)p.o.,ホラミン(d-クルロルフェニラミンマレイン酸塩) 2mg/day(day1)p.o

管理コード 200116

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1								
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用 ★カロナール,ホラミン内服 (アトセトリス投与30分前までに)★		大塚生食注(100mL瓶)	1袋	○								
2	点滴静注	時間: 30分			グラニセトロン点滴静注パック1mg/50mL	1袋	○								
3	点滴静注	時間: 30分	1Vにつき注射用水10.5mLで溶解 注射用水の欄:total量を記載 溶解後濃度:5mg/mL 必要量を抜き取り希釈	●	アトセトリス注 注射用水(100mL) 大塚生食注(100mL瓶)	1.8mg/kg 1瓶 1瓶	○								