

化学療法レジメン

レジメン名 ポラツズマブ ベドチン/R-CHP(初回)

レジメンの概要 再発又は難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫

診療科名 血液

投与量設定 リツキサン(リツキシマブ) 375mg/m²(day1),ホライビー(ポラツズマブ ベドチン) 1.8mg/kg(day2),トキソルピシン 50mg/m²(day2),エントキサン(シクロホスファミド) 750mg/m²(day2),

管理コード 200023

プレドニン 100mg/body(day2-6)p.o.,カロナール(アセトアミノフェン) 500mg(day1,2)p.o.,ホララミン(d-クルロフェニラミンマレイン酸塩) 2mg/day(day1,2)p.o

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2								
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用 ★プレドニン内服 (ホライビー投与60分前までに)★ ★カロナール,ホララミン内服 (リツキサン,ホライビー投与30分前までに)★ フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○								
2	側管静注	時間: _____			ソル・コーテフ注射用100mg	1瓶	○									
3	点滴静注	時間: 30分			パノセトロン点滴静注パック0.75mg 50mL	1袋		○								
4	点滴静注	時間: _____	50mL/h開始, 30分毎に50mL/hずつ増量可 ※最大400mL/hまで 10倍に希釈調製して使用	●	リツキサン注 生理食塩液(希釈用)	375mg/m ² mL	○									
5	点滴静注	時間: 90分	注射用水の欄:total量を記載 溶解後濃度:20mg/mL 必要量を抜き取り希釈 フィルターライン使用	●	ホライビー注 注射用水PL「フソー」(20mL) 大塚生食注(100mL瓶)	1.8mg/kg 1管 1瓶		○								
6	点滴静注	時間: 30分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フソー」 50mL	1瓶		○								
7	点滴静注	時間: 30分		●	トキソルピシン注 大塚生食注(100mL瓶)	50mg/m ² 1瓶		○								
					積算値チェック											
8	点滴静注	時間: 2時間		●	エントキサン注 大塚生食注(250mL袋)	750mg/m ² 1袋		○								