

化学療法レジメン

レジメン名 カルフィルゾミブ/DEX(初回)

レジメンの概要 再発又は難治性の多発性骨髄腫

診療科名 血液

投与量設定 カイプロリス(カルフィルゾミブ) 20mg/m²(day1),カイプロリス(カルフィルゾミブ) 70mg/m²(day8,15),デキサメタゾン 40mg/body(day1,8,15,22) p.o

管理コード 200027

インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 8	Day 15						
1	点滴静注	時間: <u>2時間</u>	★デキサメタゾン内服 (カイプロリス投与1時間前までに)★		大塚糖液5%(500mLソフトパック)	1袋	○	○	○						
2	側管静注	時間: _____			ソル・コーテフ注射用100mg	1瓶	○	○	○						
3	点滴静注	時間: <u>30分</u>	注射用水の欄:total量を記載 溶解後濃度:2mg/mL 必要量を抜き取り希釈 全量100mLに調製	●	カイプロリス注 注射用水(100mL) ブドウ糖液5% (希釈用)	20mg/m ² 1瓶 1瓶	○			カイプロリス 体表面積上限: 2.2m²					
4	点滴静注	時間: <u>30分</u>	注射用水の欄:total量を記載 溶解後濃度:2mg/mL 必要量を抜き取り希釈 全量100mLに調製	●	カイプロリス注 注射用水(100mL) ブドウ糖液5% (希釈用)	70mg/m ² 1瓶 1瓶		○	○						