

化学療法レジメン

レジメン名 ポラツズマブ ベドチン/BR(2クール目以降)

上限:5クール

レジメンの概要 再発又は難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫

診療科名 血液

投与量設定 リツキサン(リツキシマブ) 375mg/m²(day1),ポライビー(ポラツズマブ ベドチン) 1.8mg/kg(day1),トリアキシン(ベンダムスチン) 90mg/m²(day1,2),

管理コード 200022

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間) カロナル(アセトアミノフェン) 500mg(day1)p.o,ポラミン(ドクロルフェニミンマレイン酸塩) 2mg/day(day1)p.o

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2							
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用 ★カロナル,ポラミン内服 (リツキサン投与30分前までに)★ フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○							
2	点滴静注	時間: 30分			ソル・コーテフ注射用100mg パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1瓶 1袋	○								
3	点滴静注	時間: _____	100mL/h開始, 30分毎に100mL/hずつ増量可 ※最大400mL/hまで 10倍に希釈調製して使用	●	リツキサン注 生理食塩液(希釈用)	375mg/m ² mL	○								
4	点滴静注	時間: 30分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フソー」50mL	1瓶	○								
5	点滴静注	時間: 30分	注射用水の欄:total量を記載 溶解後濃度:20mg/mL 必要量を抜き取り希釈 フィルターライン使用	●	ポライビー注 注射用水PL「フソー」(20mL) 大塚生食注(100mL瓶)	1.8mg/kg 1管 1瓶	○								
6	点滴静注	時間: 30分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フソー」50mL	1瓶	○								
7	点滴静注	時間: 10分		●	トリアキシン注 生理食塩液PL「フソー」50mL	90mg/m ² 1瓶	○	○							