

# 化学療法レジメン

レジメン名 ポラツズマブ ベドチン/BR(初回)

上限:1クール

レジメンの概要 再発又は難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫

投与量設定 リツキサン(リツキシマブ) 375mg/m<sup>2</sup>(day1),ポライビー(ポラツズマブ ベドチン) 1.8mg/kg(day2),ベンダムスチン 90mg/m<sup>2</sup>(day2,3),

診療科名 血液

カロナール(アセトアミノフェン) 500mg(day1,2)p.o,ホ<sup>ラ</sup>ラミン(d-クロルフェニラミンマレイン酸塩) 2mg/day(day1,2)p.o

管理コード 200021

インターバル日数 21 (Day1から休業期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2	Day 3						
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用 ★カロナール,ポララミン内服 (リツキサン,ポライビー投与30分前までに)★ フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○	○						
2	側管静注	時間: _____			ソル・コーテフ注射用100mg	1瓶	○								
3	点滴静注	時間: 30分			ソル・コーテフ注射用100mg パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1瓶 1袋		○							
4	点滴静注	時間: _____	初回:50mL/h開始, 30分毎に50mL/hずつ増量可 2クール目以降:100mL/h開始, 30分毎に100mL/hずつ増量可 ※最大400mL/hまで 10倍に希釈調製して使用	●	リツキサン注 生理食塩液(希釈用)	375mg/m <sup>2</sup> mL	○								
5	点滴静注	時間: 90分	注射用水の欄:total量を記載 溶解後濃度:20mg/mL 必要量を抜き取り希釈 フィルターライン使用	●	ポライビー注 注射用水PL「フソー」(20mL) 大塚生食注(100mL瓶)	1.8mg/kg 1管 1瓶		○							
6	点滴静注	時間: 30分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フソー」50mL	1瓶		○							
7	点滴静注	時間: 10分		●	ベンダムスチン注 生理食塩液PL「フソー」50mL	90mg/m <sup>2</sup> 1瓶		○	○						