

# 化学療法レジメン

レジメン名 イサツキシマブ/DEX(2クール目以降)

レジメンの概要 再発又は難治性の多発性骨髄腫

診療科名 血液

投与量設定 サークサ(イサツキシマブ) 20mg/kg(day1,15),レナテックス(デキサメタゾン) 20-40mg(day1,8,15,22)p.o.カロナール(アセトアミノフェン) 500mg(day1,15)p.o.ホラミン(d-クロルフェニラミン塩酸塩) 2mg(day1,15)p.o

管理コード 200203

インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 15							
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用 ★レナテックス,カロナール,ホラミン内服 (サークサ投与30分前までに)★		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○							
2	点滴静注	時間: _____	全量250mLに調製 フィルターライン使用  別紙投与速度換算表 に従って速度調節	●	サークサ注 生理食塩液(希釈用)	20mg/kg 1袋	○	○							
		時間: _____													
		時間: _____													
		時間: _____													
		時間: _____													
		時間: _____													