

# 化学療法レジメン

レジメン名 CHP/ブレンツキシマブ ベドチン

上限:8クール

レジメンの概要 CD30陽性の末梢性T細胞リンパ腫

診療科名 血液

投与量設定

トキソルピシン 50mg/m<sup>2</sup>(day1),エンドキサン(シクロホスファミド) 750mg/m<sup>2</sup>(day1),アドセトリス(ブレンツキシマブ ベドチン) 1.8mg/kg(day1),フレドニン 100mg/body(day1-5),p.o.カロナル(アゼチアミド/フエン) 500mg(day1),p.o.ボラミン(d-グルルフェニラミン酸塩) 2mg/day(day1),p.o.

管理コード 200117

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1								
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用 ★カロナル,ボラミン内服 (アドセトリス投与30分前までに)★		大塚生食注(100mL瓶)	1袋	○								
2	点滴静注	時間: 15分			パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1袋	○								
3	点滴静注	時間: 30分		●	トキソルピシン注 大塚生食注(100mL瓶)	50mg/m <sup>2</sup> 1瓶	○								
					<b>積算値チェック</b>										
4	点滴静注	時間: 2時間		●	エンドキサン注 大塚生食注(250mL袋)	750mg/m <sup>2</sup> 1袋	○								
5	点滴静注	時間: 30分	1Vにつき注射用水10.5mLで溶解 注射用水の欄:total量を記載 溶解後濃度:5mg/mL 必要量を抜き取り希釈	●	アドセトリス注 注射用水(100mL) 大塚生食注(100mL瓶)	1.8mg/kg 1瓶 1瓶	○								