

化学療法レジメン

レジメン名 CHP/ブレンツキシマブ ベドチン

上限:8クール

レジメンの概要 CD30陽性の末梢性T細胞リンパ腫

診療科名 血液

投与量設定

ドキソルピシン 50mg/m²(day1),エンドキサン(シクロホスファミド) 750mg/m²(day1),アトセトリス(ブレンツキシマブ ベドチン) 1.8mg/kg(day1),フレドニン 100mg/body(day1-5)p.o.,カロナール(アセトアミノフェン) 500mg(day1)p.o.,ホウライミン(d-グルルフェニラミンレイン酸塩) 2mg/day(day1)p.o.

管理コード 200117

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

| Rp | 手技・投与経路 | 点滴時間 | 用法・その他 | 癌 | 薬品名称 | 用量/単位 | Day 1 | | | | | | | | | |
|----|---------|-----------|--|---|---|----------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 点滴静注 | 時間: _____ | ルートkeep用 フラッシュ用 ★カロナール,ホウライミン内服 (アトセトリス投与30分前までに)★ | | 大塚生食注(100mL瓶) | 1袋 | ○ | | | | | | | | | |
| 2 | 点滴静注 | 時間: 15分 | | | パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg 50mL | 1袋 | ○ | | | | | | | | | |
| 3 | 点滴静注 | 時間: 30分 | | ● | ドキソルピシン注 大塚生食注(100mL瓶) | 50mg/m ² 1瓶 | ○ | | | | | | | | | |
| | | | | | 積算値チェック | | | | | | | | | | | |
| 4 | 点滴静注 | 時間: 2時間 | | ● | エンドキサン注 大塚生食注(250mL袋) | 750mg/m ² 1袋 | ○ | | | | | | | | | |
| 5 | 点滴静注 | 時間: 30分 | IVにつき注射用水10.5mLで溶解 注射用水の欄:total量を記載 溶解後濃度:5mg/mL 必要量を抜き取り希釈 | ● | アトセトリス注 注射用水(100mL) 大塚生食注(100mL瓶) | 1.8mg/kg 1瓶 1瓶 | ○ | | | | | | | | | |
| | | 時間: _____ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 時間: _____ | | | | | | | | | | | | | | |