

化学療法レジメン

レジメン名 MPV(1,3,5,(7)ケール目)

レジメンの概要 中枢神経系原発性リンパ腫

診療科名 血液

投与量設定

オンコピン(シタキソン) 1.4mg/m<sup>2</sup>(day1),メトキシセト(メトキシセト) 3500mg/m<sup>2</sup>(day1),プロカルバジン 100mg/m<sup>2</sup>(day1-7)p.o.72時間前からST合剤中止,ループ利尿薬・NSAIDsはMTX感度以下まで併用禁忌

管理コード 200130

インターバル日数 14 (Day1から休業期間を含めたレジメン有効期間) 胸腹水がある症例は投与注意,CREによる用量調節は必要無い

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 0	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5					
1	点滴静注 末梢側管	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶		○									
2	点滴静注 末梢メイン	時間: 8時間			メイロン静注7% 大塚生食注(1000mLソフトバック)	2管 1袋		○ 9:00									
3	点滴静注 末梢側管	時間: 30分			パロノセロン点滴静注バック0.75mg 50mL アロカス点滴静注235mg	1袋 1瓶		○ 10:00									
4	点滴静注 末梢側管	時間: 30分	※最大1回2mg/body	●	オンコピン注 生理食塩液PL「フソー」50mL	1.4mg/m <sup>2</sup> 1瓶		○ 10:30									
5	点滴静注 末梢側管	時間: 3時間	全量500mLに調製	●	メトキシセト注 生理食塩液(希釈用)	3500mg/m <sup>2</sup> 1袋		○ 11:00									
6	側管静注	時間: _____	メトキシセトの血中濃度に応じて 増量の可能性有り 医師指示に従うこと		ロイコホリン注3mg	5管				○ 11:00 5管固定	○ 11:00	○ 11:00					
7	側管静注	時間: _____	生食10mLで溶解し5mL採取 シリンジで払い出し		ダイアモックス注 大塚生食注(20mL)	0.5瓶 0.25管		○ 15:00									
8	点滴静注 末梢メイン	時間: 8時間			メイロン静注7% 大塚生食注(1000mLソフトバック)	2管 1袋		○ 17:00									
9	側管静注	時間: _____	メトキシセトの血中濃度に応じて 増量の可能性有り 医師指示に従うこと		ロイコホリン注3mg	5管				○ 17:00	○ 17:00						
10	点滴静注	時間: 12時間			メイロン静注7% 大塚生食注(1000mLソフトバック)	2管 1袋	○ 21:00										
11	側管静注	時間: _____	生食10mLで溶解し5mL採取 シリンジで払い出し		ダイアモックス注 大塚生食注(20mL)	0.5瓶 0.25管	○ 21:00	○ 21:00									
12	側管静注	時間: _____	メトキシセト投与開始36時間後より開始		ロイコホリン注3mg	17管			○ 23:00								
13	側管静注	時間: _____	メトキシセトの血中濃度に応じて 増量の可能性有り 医師指示に従うこと		ロイコホリン注3mg	5管				○ 23:00	○ 23:00						
14	点滴静注 末梢メイン	時間: 8時間			メイロン静注7% 大塚生食注(1000mLソフトバック)	2管 1袋		○ 1:00									
15	側管静注	時間: _____	生食10mLで溶解し5mL採取 シリンジで払い出し		ダイアモックス注 大塚生食注(20mL)	0.5瓶 0.25管		○ 3:00									
16	側管静注	時間: _____	メトキシセトの血中濃度に応じて 増量の可能性有り 医師指示に従うこと		ロイコホリン注3mg	5管			○ 5:00 5管固定	○ 5:00	○ 5:00						