

# 化学療法レジメン

レジメン名 ダラツムマブ/Kd(7クール目以降)

レジメンの概要 再発又は難治性の多発性骨髄腫

投与量設定 カイプロリス(カルフィルゾミブ) 56mg/m<sup>2</sup>(day1,2,8,9,15,16),ダラキューロ(ダラツムマブ,ホルヒアルロニダーゼ アルファ) 1瓶(day1),

診療科名 血液

デキサメタゾン 20mg/body(day1,2,8,9,15,16) p.o,デキサメタゾン 40mg/body(day22) p.o,カロナール(アセトアミノフェン) 500mg(day1)p.o,

管理コード 200093

インターバル日数 28 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間) ホラミン(d-クロルフェニミンマレイン酸塩) 2mg(day1)p.o モンテルカスト10mg(day1)p.o

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2	Day 8	Day 9	Day 15	Day 16			
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用  ★デキサメタゾン,カロナール,ホラミン,モンテルカスト内服 (カイプロリス及びダラキューロ投与1時間前までに)★		ブドウ糖液5%(100mL)	1袋	○	○	○	○	○	○			
2	点滴静注	時間: 30分	全量100mLに調製 注射用水の欄:total量を記載	●	カイプロリス注 注射用水(100mL) ブドウ糖液5%(希釈用)	56mg/m <sup>2</sup> 1瓶 1瓶	○	○	○	○	○	○			
3	皮下注射	時間: _____	臍から左又は右に約7.5cmの腹部皮下に 本剤15mLを約3～5分かけて投与	●	ダラキューロ注	1瓶	○								