

化学療法レジメン

レジメン名 パニツムマブ/FOLFOX6

レジメンの概要 結腸、直腸癌

診療科名 消化器

投与量設定 パニツムマブ (パニツムマブ) 6mg/kg(day1), レボレチン 200mg/m²(day1), オキサリプラチン 85mg/m² (day1), フルオウラシル 400mg/m²(bolus)(day1), 2400mg/m²(46hr)(day1-2)

管理コード 100008

インターバル日数 14 (Day1から休業期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1								
1	CVポート メイン	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○								
2	CVポート メイン	時間: 1時間	全量100mLに調製 フィルターライン使用	●	パニツムマブ 注 生理食塩液 (希釈用)	6mg/kg 1瓶	○								
3	CVポート メイン	時間: 15分			デキサメタゾン 注射液6.6mg グロコチン 点滴静注パック 1mg/50mL	1瓶 1袋	○								
4	CVポート 側管	時間: 2時間	オキサリプラチン と同時投与		レボレチン 注 大塚糖液5%(250mLソフトパック)	200mg/m ² 1袋	○								
5	CVポート メイン	時間: 2時間	レボレチン と同時投与 全量250mLに調製	●	オキサリプラチン 注 ブドウ糖 液5% (希釈用)	85mg/m ² 1袋	○								
6	CVポート メイン	時間: 10分	全開で	●	フルオウラシル 注 生理食塩液PL「フー」 50mL	400mg/m ² 1瓶	○								
7	CVポート メイン	時間: 46時間	携帯型ディスポ注入器 全量100mLに調製	●	フルオウラシル 注 生理食塩液 (希釈用)	2400mg/m ² 1瓶	○								