

化学療法レジメン

レジメン名 トラスツズマブ/SP(初回8mg/kg)

レジメンの概要 HER2過剰発現が確認された治癒切除不能な進行・再発の胃癌

診療科名 消化器

投与量設定 トラスツズマブ 8mg/kg(day1),シスプラチン 60mg/m<sup>2</sup>(day1),エスワンタイホウ(テガフル・キメラシル・オテラシルK)80-120mg/day1日2回(day1-14)p.o

管理コード 100086

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day0	Day 1	Day 2	Day 3							
1	点滴静注 末梢メイン	時間: <u>1時間30分</u>			硫酸Mg補正液1mEq/mL	1管		○									
					大塚生食注(500mL袋)	1袋		6:00									
2	点滴静注 末梢メイン	時間: <u>1時間</u>			大塚生食注(250mL袋)	1袋		○									
								7:30									
3	点滴静注 末梢メイン	時間: <u>30分</u>			デキサート注射液6.6mg	1.5瓶		○									
					アロカス点滴静注235mg	1瓶		8:30									
					パロセトン点滴静注バッグ0.75mg 50mL	1袋											
4	点滴静注 末梢側管	時間: <u>30分</u>			デキサート注射液6.6mg	1瓶			○	○							
					生理食塩液PL「フソー」50mL	1瓶			10:00	10:00							
5	点滴静注 末梢メイン	時間: <u>1時間30分</u>	初回8mg/kg 注射用水の欄:total量を記載 溶解後濃度:21mg/mL 必要量を抜き取り希釈	●	トラスツズマブBS注	8mg/kg		○									
					注射用水(100mL)	1瓶		9:00									
					大塚生食注(250mL袋)	1袋											
6	点滴静注 末梢メイン	時間: <u>2時間</u>			マンニトールS注射液300mL	1袋		○									
								10:30									
7	点滴静注 末梢メイン	時間: <u>2時間</u>	不要分を抜いて 合計600mLに調製	●	シスプラチン注	60mg/m <sup>2</sup>		○									
					生理食塩液(希釈用)	1袋		12:30									
8	点滴静注 末梢側管	時間: <u>2時間</u>			ソラクト輸液(500mL袋)	1袋		○	○	○							
								14:30	10:30	10:30							
9	点滴静注	時間: <u>4時間</u>			ソラクト輸液(500mL袋)	1袋	○										
								17:00									
10	点滴静注 末梢側管	時間: <u>2時間</u>			フジオ140輸液 500ml	1袋		○	○	○							
								16:30	12:30	12:30							
11	点滴静注 末梢側管	時間: <u>2時間</u>			ソルデム3A輸液(500mL)	1袋		○	○	○							
								18:30	14:30	14:30							
12	点滴静注 末梢メイン	時間: _____	ルートフラッシュ		生食液NS 20mL	1管		○	○								
								20:30	16:30								
13	点滴静注	時間: <u>4時間</u>			ソルデム3A輸液(500mL)	1袋	○										
								21:00									
14	点滴静注	時間: <u>5時間</u>			生理食塩液(500mL袋)	1袋	○										
								1:00									

積算値チェック