

# 化学療法レジメン

**レジメン名** ポラツズマブ ベドチン/R-CHP(初回)  
**レジメンの概要** 再発又は難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫  
**投与量設定** リツキマブ 375mg/m<sup>2</sup>(day1),ホ<sup>o</sup>ライ化<sup>o</sup>- (ホ<sup>o</sup>ラツズマブ ベドチン) 1.8mg/kg(day2),ド<sup>o</sup>キルビ<sup>o</sup>シ<sup>o</sup> 50mg/m<sup>2</sup>(day2),イント<sup>o</sup>キ<sup>o</sup> (シカ<sup>o</sup>味<sup>o</sup>ス<sup>o</sup>ア<sup>o</sup>ミ<sup>o</sup>ド<sup>o</sup>) 750mg/m<sup>2</sup>(day2),  
 プ<sup>o</sup>レ<sup>o</sup>ト<sup>o</sup>ニ<sup>o</sup> 100mg/body(day2-6)p.o,加<sup>o</sup>ナ<sup>o</sup>ル<sup>o</sup> (ア<sup>o</sup>セ<sup>o</sup>ト<sup>o</sup>ア<sup>o</sup>ミ<sup>o</sup>ノ<sup>o</sup>イ<sup>o</sup>ン) 500mg(day1,2)p.o,ホ<sup>o</sup>ラ<sup>o</sup>ミ<sup>o</sup> (d-加<sup>o</sup>ル<sup>o</sup>ノ<sup>o</sup>エ<sup>o</sup>ニ<sup>o</sup>ラ<sup>o</sup>ミ<sup>o</sup>ノ<sup>o</sup>レ<sup>o</sup>イ<sup>o</sup>ン<sup>o</sup>酸<sup>o</sup>塩) 2mg/day(day1,2)p.o  
**診療科名** 血液  
**管理コード** 200023 **インターバル日数** 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2							
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用 ★プ <sup>o</sup> レ <sup>o</sup> ト <sup>o</sup> ニ <sup>o</sup> 内服 (ホ <sup>o</sup> ラ <sup>o</sup> 化 <sup>o</sup> -投与60分前までに)★ ★加 <sup>o</sup> ナ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> ,ホ <sup>o</sup> ラ <sup>o</sup> ミ <sup>o</sup> 内服 (リツ <sup>o</sup> キ <sup>o</sup> マ <sup>o</sup> ブ,ホ <sup>o</sup> ラ <sup>o</sup> 化 <sup>o</sup> -投与30分前までに)★ フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○							
2	側管静注	時間: _____			リ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> ・コ <sup>o</sup> ー <sup>o</sup> テ <sup>o</sup> フ <sup>o</sup> 注射用100mg	1瓶	○								
3	点滴静注	時間: 30分			パ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> セ <sup>o</sup> ト <sup>o</sup> ノ <sup>o</sup> 点 <sup>o</sup> 滴 <sup>o</sup> 静 <sup>o</sup> 注 <sup>o</sup> バ <sup>o</sup> グ <sup>o</sup> 0.75mg 50mL	1袋		○							
4	点滴静注	時間: _____	初回: 50mL/h開始, 30分毎に50mL/hずつ増量可 2カ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> 目以降: 100mL/h開始, 30分毎に100mL/hずつ増量可 ※最大400mL/hまで 10倍に希釈調製して使用	●	リツ <sup>o</sup> キ <sup>o</sup> マ <sup>o</sup> ブ BS注 生理食塩液 (希釈用)	375mg/m <sup>2</sup> mL	○								
5	点滴静注	時間: 90分	注射用水の欄: total量を記載 溶解後濃度: 20mg/mL 必要量を抜き取り希釈 フィルターライン使用	●	ホ <sup>o</sup> ラ <sup>o</sup> 化 <sup>o</sup> -注 注射用水PL「フ <sup>o</sup> ツ <sup>o</sup> 」(20mL) 大塚生食注(100mL瓶)	1.8mg/kg 1管 1瓶		○							
6	点滴静注	時間: 30分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フ <sup>o</sup> ツ <sup>o</sup> 」 50mL	1瓶		○							
7	点滴静注	時間: 30分	<b>積算値チェック</b>	●	ド <sup>o</sup> キ <sup>o</sup> ル <sup>o</sup> ビ <sup>o</sup> シ <sup>o</sup> 注 大塚生食注(100mL瓶)	50mg/m <sup>2</sup> 1瓶		○							
8	点滴静注	時間: 2時間		●	イント <sup>o</sup> キ <sup>o</sup> 注 大塚生食注(250mL袋)	750mg/m <sup>2</sup> 1袋		○							