

化学療法レジメン

レジメン名 ダラツムマブ/Kd(初回)

レジメンの概要 再発又は難治性の多発性骨髄腫

投与量設定 カイプロリス(カルフィルゾミブ) 20mg/m²(day1,2),カイプロリス(カルフィルゾミブ) 56mg/m²(day8,9,15,16),ダラキューロ(ダラツムマブ,ホルヒアルロニダーゼ アルファ) 1瓶(day1,8,15,22),

診療科名 血液

デキサメタゾン 20mg/body(day1,2,8,9,15,16) p.o,デキサメタゾン 40mg/body(day22) p.o,ドロール(メチルプレドニゾロン) 20mg(day3) p.o,カロナール(アセトアミノフェン) 500mg(day1,8,15,22)p.o,

管理コード 200090

インターバル日数 28 (Day1から休業期間を含めたレジメン有効期間) ホララミン(d-カルコルフェニラミン酸塩) 2mg(day1,8,15,22)p.o モンテルカスト10mg(day1,8,15,22)p.o

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 2	Day 8	Day 9	Day 15	Day 16	Day 22		
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用 <small>★デキサメタゾン,カロナール,ホララミン,モンテルカスト内服 (カイプロリス及びダラキューロ投与1時間前までに)★</small>		ブドウ糖液5%(100mL)	1袋	○	○	○	○	○	○			
2	側管静注	時間: _____			ゾル・コーテフ注射用100mg	1瓶	○		○		○				
3	点滴静注	時間: 30分	全量100mLに調製 注射用水の欄:total量を記載	●	カイプロリス注 注射用水(100mL) ブドウ糖液5%(希釈用)	20mg/m ² 1瓶 1瓶	○	○							
4	点滴静注	時間: 30分	全量100mLに調製 注射用水の欄:total量を記載	●	カイプロリス注 注射用水(100mL) ブドウ糖液5%(希釈用)	56mg/m ² 1瓶 1瓶			○	○	○	○			
5	皮下注射	時間: _____	<small>★デキサメタゾン,カロナール,ホララミン,モンテルカスト内服 (ダラキューロ投与1時間前までに)★ 臍から左又は右に約7.5cmの腹部皮下に 本剤15mLを約3~5分かけて投与</small>	●	ダラキューロ注	1瓶	○		○		○		○		