

化学療法レジメン

レジメン名 ペムブロリズマブ/PTX/CBDCA(乳腺)

上限:4クール

レジメンの概要 ホルモン受容体陰性かつHER2陰性で再発高リスクの乳癌における術前薬物療法

診療科名 乳腺

投与量設定 キイトルーダ(ペムブロリズマブ) 200mg/body(day1),パクリタキセル 80mg/m²(day1,8,15),カルボプラチン AUC=1.5,投与量=AUC×(25+GFR)(day1,8,15)

管理コード 150220

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 8	Day 15							
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○	○							
2	点滴静注	時間: 30分	フィルターライン使用	●	キイトルーダ注 生理食塩液PL「フソー」50mL	200mg/body 1瓶	○	4クール施行後 ペムブロリズマブ/DXR/CPA(150230)へ移行								
3	点滴静注	時間: 10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「フソー」50mL	1瓶	○									
4	点滴静注	時間: 15分			デキサート注射液6.6mg ファモチジン注射用20mg ポプラミン注5mg グラネセロン点滴静注バッグ1mg/50mL	1瓶 1管 2管 1袋	○	○	○							
5	点滴静注	時間: 1時間	フィルターライン使用	●	パクリタキセル注 大塚生食注(250mL袋)	80mg/m ² 1袋	○	○	○							
6	点滴静注	時間: 1時間		●	カルボプラチン注 大塚糖液5%(250mLソフトバッグ)	AUC=1.5 1袋	○	○	○							