

化学療法レジメン

レジメン名 MPV(1,3,5,(7)ケール目)【レボホリナート代替】

レジメンの概要 中枢神経系原発悪性リンパ腫

診療科名 血液

投与量設定

オンコピン(メトキシケート) 1.4mg/m²(day1),メトキシケート(非メトキシケート) 3500mg/m²(day1),プロクロルピラジン 100mg/m²(day1-7)p.o.72時間前からST合剤中止,ルーブ利尿薬・NSAIDsはMTX感度以下まで併用禁忌

管理コード 201001

インターバル日数 14 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間) 胸腹水がある症例は投与注意,CREによる用量調節は必要無い

| Rp | 手技・投与経路 | 点滴時間 | 用法・その他 | 癌 | 薬品名称 | 用量/単位 | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | | | | |
|----|---------------|-----------|--|---|----------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|
| 1 | 点滴静注 末梢側管 | 時間: _____ | | | ルートkeep用 フラッシュ用 | 大塚生食注(100mL瓶) | 1瓶 | | ○ | | | | | | | |
| 2 | 点滴静注 末梢メイン | 時間: 8時間 | | | マイロン静注7% 大塚生食注(1000mLソフトバック) | 2管 1袋 | | ○ 9:00 | | | | | | | | |
| 3 | 点滴静注 末梢側管 | 時間: 30分 | | | プロイムド点滴静注用150mg 大塚生食注(100mL瓶) | 1瓶 1瓶 | | ○ 9:30 | | | | | | | | |
| 4 | 点滴静注 末梢側管 | 時間: 30分 | | | パロメトロン点滴静注バック0.75mg 50mL | 1袋 | | ○ 10:00 | | | | | | | | |
| 5 | 点滴静注 末梢側管 | 時間: 30分 | ※最大1回2mg/body | ● | オンコピン注 生理食塩液PL「フソー」50mL | 1.4mg/m ² 1瓶 | | ○ 10:30 | | | | | | | | |
| 6 | 点滴静注 末梢側管 | 時間: 3時間 | 全量500mLに調製 | ● | メトキシケート注 生理食塩液(希釈用) | 3500mg/m ² 1袋 | | ○ 11:00 | | | | | | | | |
| 7 | 側管静注 | 時間: _____ | メトキシケートの血中濃度に応じて 増量の可能性有り 医師指示に従うこと 生食20mLで溶解し6mL採取 | | レボホリナート注25mg 生食液NS 20mL | 0.3瓶 0.3管 | | | | ○ 11:00 | ○ 11:00 | ○ 11:00 | | | | |
| 8 | 側管静注 | 時間: _____ | 生食10mLで溶解し5mL採取 シリンジで払い出し | | ダイモックス注 生食液NS 20mL | 0.5瓶 0.25管 | | ○ 15:00 | | | | | | | | |
| 9 | 点滴静注 末梢メイン | 時間: 8時間 | | | マイロン静注7% 大塚生食注(1000mLソフトバック) | 2管 1袋 | | ○ 17:00 | | | | | | | | |
| 10 | 側管静注 | 時間: _____ | メトキシケートの血中濃度に応じて 増量の可能性有り 医師指示に従うこと 生食20mLで溶解し6mL採取 | | レボホリナート注25mg 生食液NS 20mL | 0.3瓶 0.3管 | | | | ○ 17:00 | ○ 17:00 | | | | | |
| 11 | 点滴静注 | 時間: 12時間 | | | マイロン静注7% 大塚生食注(1000mLソフトバック) | 2管 1袋 | ○ 21:00 | | | | | | | | | |
| 12 | 側管静注 | 時間: _____ | 生食10mLで溶解し5mL採取 シリンジで払い出し | | ダイモックス注 生食液NS 20mL | 0.5瓶 0.25管 | ○ 21:00 | ○ 21:00 | | | | | | | | |
| 13 | 側管静注 | 時間: _____ | メトキシケート投与開始36時間後より開始 生食20mLで溶解し全量採取 | | レボホリナート注25mg 生食液NS 20mL | 1瓶 1管 | | | ○ 23:00 | | | | | | | |
| 14 | 側管静注 | 時間: _____ | メトキシケートの血中濃度に応じて 増量の可能性有り 医師指示に従うこと 生食20mLで溶解し6mL採取 | | レボホリナート注25mg 生食液NS 20mL | 0.3瓶 0.3管 | | | | ○ 23:00 | ○ 23:00 | | | | | |
| 15 | 点滴静注 末梢メイン | 時間: 8時間 | | | マイロン静注7% 大塚生食注(1000mLソフトバック) | 2管 1袋 | | ○ 1:00 | | | | | | | | |
| 16 | 側管静注 | 時間: _____ | 生食10mLで溶解し5mL採取 シリンジで払い出し | | ダイモックス注 生食液NS 20mL | 0.5瓶 0.25管 | | ○ 3:00 | | | | | | | | |
| 17 | 側管静注 | 時間: _____ | メトキシケートの血中濃度に応じて 増量の可能性有り 医師指示に従うこと 生食20mLで溶解し6mL採取 | | レボホリナート注25mg 生食液NS 20mL | 0.3瓶 0.3管 | | | ○ 5:00 | ○ 5:00 | ○ 5:00 | | | | | |