

化学療法レジメン

レジメン名 トラスツズマブ/G-SOX(2クール目以降6mg/kg)

レジメンの概要 胃癌

診療科名 消化器

投与量設定 トラスツズマブ 6mg/kg(day1),オキサリプラチン 100mg/m²(day1),エスワンタイホウ(テカフル・キメラシル・オテラシルK) 80-120mg/day1日2回(day1-14)

管理コード 100082

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1									
1	点滴静注	時間: _____	ルートkeep用 フラッシュ用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○									
2	点滴静注	時間: <u>30分</u>	注射用水の欄:total量を記載 溶解後濃度:21mg/mL 必要量を抜き取り希釈	●	トラスツズマブBS注 注射用水(100mL) 大塚生食注(250mL袋)	6mg/kg 1瓶 1袋	○									
3	点滴静注	時間: <u>15分</u>			デキサート注射液6.6mg グラネセロン点滴静注パック1mg/50mL	1瓶 1袋	○									
4	点滴静注	時間: <u>2時間</u>	全量500mLに調製	●	オキサリプラチン注(全量500mL用) ブドウ糖液5% (希釈用)	100mg/m ² 1袋	○									