

化学療法レジメン

レジメン名 デュルバルマブ/CDDP/GEM

上限：8クール

レジメンの概要 治癒切除不能な胆道癌

診療科名 消化器

投与量設定 イミフィンジ(デュルバルマブ) 1500mg/body(day1),シプロラチン 25mg/m<sup>2</sup>(day1,8),ゲムシタビン 1000mg/m<sup>2</sup>(day1,8)

管理コード 100230

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

Rp	手技・投与経路	点滴時間	用法・その他	癌	薬品名称	用量/単位	Day 1	Day 8							
1	点滴静注 末梢メイン	時間：_____	ルートkeep用 フラッシュ用 フィルターライン使用		大塚生食注(100mL瓶)	1瓶	○	○							
2	点滴静注 末梢メイン	時間：1時間	フィルターライン使用	●	イミフィンジ注 大塚生食注(250mL袋)	1500mg/body 1袋	○		<b>イミフィンジ(デュルバルマブ)： 体重30kg以下には未適応</b>						
3	点滴静注 末梢メイン	時間：10分	フラッシュ用		生理食塩液PL「77-」 50mL	1瓶	○								
4	点滴静注 末梢メイン	時間：15分			デキサト注射液6.6mg ガラセト点滴静注バッグ 1mg/50mL	1瓶 1袋	○	○							
5	点滴静注 末梢メイン	時間：1時間30分	<b>積算値チェック</b>	●	シプロラチン注 大塚生食注(500mL袋)	25mg/m <sup>2</sup> 1袋	○	○	<b>8クール施行後 デュルバルマブ(消化器) (100235)へ移行</b>						
6	点滴静注 末梢メイン	時間：30分		●	ゲムシタビン注 大塚生食注(100mL瓶)	1000mg/m <sup>2</sup> 1瓶	○	○							
7	点滴静注 末梢側管	時間：1時間30分	ゲムシタビンと同時に 側管より		硫酸Mg補正液1mEq/mL リューゲンF注 500mL	1管 1袋	○	○							