

# 化学療法レジメン

レジメン名 ペムブロリズマブ/GEM/CBDCA

レジメンの概要 PD-L1陽性のホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌

診療科名 乳腺

投与量設定 キイトルーダ(ペムブロリズマブ) 200mg/body(day1),ゲムシタビン 1000mg/m<sup>2</sup>(day1,8),カルボプラチン AUC=2,投与量=AUC×(25+GFR)(day1,8)

管理コード 150210

インターバル日数 21 (Day1から休薬期間を含めたレジメン有効期間)

| Rp | 手技・投与経路 | 点滴時間      | 用法・その他   | 癌 | 薬品名称                                   | 用量/単位                       | Day 1 | Day 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------|-----------|--|---|--|-----------------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1  | 点滴静注    | 時間: _____ | ルートkeep用<br>フラッシュ用<br>フィルターライン使用<br>★アプレビタント内服(3日間連投<br>1日目:カルボプラチン投与1~1.5時間前<br>2日目以降:午前中)★ |   | 大塚生食注(100mL瓶)                          | 1瓶                          | ○     | ○     |  |  |  |  |  |  |  |
| 2  | 点滴静注    | 時間: 30分   |  | ● | キイトルーダ注<br>生理食塩液PL「フソー」50mL            | 200mg/body<br>1瓶            | ○     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3  | 点滴静注    | 時間: 10分   | フラッシュ用   |   | 生理食塩液PL「フソー」50mL                       | 1瓶                          | ○     |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 4  | 点滴静注    | 時間: 15分   |  |   | デキサート注射液6.6mg<br>グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50mL | 1瓶<br>1袋                    | ○     | ○     |  |  |  |  |  |  |  |
| 5  | 点滴静注    | 時間: 30分   |  | ● | ゲムシタビン注<br>大塚生食注(100mL瓶)               | 1000mg/m <sup>2</sup><br>1瓶 | ○     | ○     |  |  |  |  |  |  |  |
| 6  | 点滴静注    | 時間: 1時間   |  | ● | カルボプラチン注<br>大塚糖液5%(250mLソフトバッグ)        | AUC=2<br>1袋                 | ○     | ○     |  |  |  |  |  |  |  |